

Frågeformulär fredag em 2 februari. ISPO Amputationskurs, 2024.


Namn

Markus
Julia Fagergren Ekholm
Muje El Noaimi
Julia von Schewen
Hassib
Jonathan Parling
Madeleine
Malin Hultberg
Anders Pettersson
Josefin
Anna HS
Emmi
Emma Sernestrand
Lisa Nilsson
Matilda
Samuel Ahlenius
Erik Lerjefors
Ida
Anna Lisspers Lindau
Dlshad
Christoffer Thorsell
Rafie Kaner
Lukas Pav
Elin Roslund
Linnéa Örtengren

- Sagitella lambåer vid TTA möjliggör snabbare rehabilitering än lång bakre lambå

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Exartikulation av knäled ger sämre sittande balans än TFA

Namn	Antal	%
Sant	1	3,8
Falskt	25	96,2
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Längre TTA-stump (15–25 cm nedom knät) ger bättre rehabresultat

Namn	Antal	%
Sant	25	96,2
Falskt	1	3,8
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Genom osseointegration kan idag utvalda patienter få en fungerande protesförsörjning via ett implantat. Metoden lämpar sig i nuläget bäst för i övrigt friska personer med transfemoral amputation och som har svårigheter att använda en protes med hylsa.

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Ultrakort TTA-stump (vid underkanten av tuberositas tibiae) ger bättre resultat än högre nivå för geriatrisk patient

Namn	Antal	%
Sant	24	92,3
Falskt	2	7,7
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Benförankring av hamstrings är avgörande för bra funktion vid TFA

Namn	Antal	%
Sant	11	42,3
Falskt	15	57,7
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Den vanligaste komplikationen som kräver operativ åtgärd hos personer som använder en osseointegrerad transfemoral protes är slitage eller fraktur av implantatdel(ar).

Namn	Antal	%
Sant	19	73,1
Falskt	7	26,9
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Symes amputation rekommenderas främst vid barnamputationer

Namn	Antal	%
Sant	18	69,2
Falskt	8	30,8
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Implantatnära osteomyelit är en allvarlig och inte ovanlig komplikation vid osseointegrerad transfemoral protes.

Namn	Antal	%
Sant	23	88,5
Falskt	3	11,5
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Det är mindre risk för skav i en rymlig proteshylsa

Namn	Antal	%
Sant	2	7,7
Falskt	24	92,3
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Hundöron på TTA är vanligast vid lång bakre lambå

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Ligamentum patellae ska alltid sutureras till korsbanden vid knäledsexartikulation

Namn	Antal	%
Sant	6	23,1
Falskt	20	76,9
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Energilagrande fot är onödigt dyrt till geriatriska patienter

Namn	Antal	%
Sant	7	26,9
Falskt	19	73,1
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Patienter som inte planeras för protes behöver inte träna rörlighet.

Namn	Antal	%
Sant	0	0
Falskt	26	100
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Antalet benamputationer (major amputation) i Sverige är ca 4 000 per år

Namn	Antal	%
Sant	1	4
Falskt	24	96
Total	25	100


Svarsfrekvens
96,2% (25/26)



- Det är viktigt att komma ihåg djupa odlingar (vävnadsodlingar) och ev 16SrDNA vid amputation och sårrevision i framfoten hos diabetespatienter. Detta då ytliga sårodlingar oftast inte säger så mycket hos dessa patienter.

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Stelt förband är vanligaste postoperativa behandlingen efter TTA

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Kostnaden vid större amputation (från inskrivning till utskrivning) ligger på 28 000kr

Namn	Antal	%
Sant	0	0
Falskt	26	100
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Multidisciplinärt arbetsätt vid rehabilitering av amputerade är Golden standard idag

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Det finns inte protesfötter för låg bygghöjd (när stumpen är lång)

Namn	Antal	%
Sant	0	0
Falskt	26	100
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Stelt förband har ingen betydelse för tid till protesförsörjning

Namn	Antal	%
Sant	1	3,8
Falskt	25	96,2
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Mikroprocessorstyrd knäled minskar fallrisken

Namn	Antal	%
Sant	25	96,2
Falskt	1	3,8
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Det finns bara en suspensionsteknik vid TF protesförsörjning

Namn	Antal	%
Sant	0	0
Falskt	26	100
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Tidig postoperativ behandling med liner är förberedande för stumpen innan protesförsörjningen

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Stumpen måste vara helt läkt om patienten ska kunna bli protesförsörd

Namn	Antal	%
Sant	0	0
Falskt	26	100
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Rehabilitering börjar vid utskrivning från akutavdelningen

Namn	Antal	%
Sant	7	26,9
Falskt	19	73,1
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Silikon har i studier visad positiv effekt på ärrvävnad

Namn	Antal	%
Sant	24	92,3
Falskt	2	7,7
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Vikten av protesens betydelse för användaren

Namn	Antal	%
Sant	0	0
Falskt	26	100
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Benamputerade är en patientgrupp med hög ålder, flera komorbiditeter och hög 1 års mortalitet.

Namn	Antal	%
Sant	24	92,3
Falskt	2	7,7
Total	26	100

Svarsfrekvens
100% (26/26)




- Mikroprocessorstyrd knäled är ett självklart val till geriatriska patienter

Namn	Antal	%
Sant	1	3,8
Falskt	25	96,2
Total	26	100

Svarsfrekvens

100% (26/26)




- Tibiaspetsen rör sig i genomsnitt 232 m dagligen i PTB proteshylsan om man har en sådan

Namn	Antal	%
Sant	20	76,9
Falskt	6	23,1
Total	26	100

Svarsfrekvens


100% (26/26)



- Patienter som har en osseointegrerad lårbensprotes rapporterar väsentligt mindre fantomsmärtor än före implantatkirurgin.

Namn	Antal	%
Sant	15	57,7
Falskt	11	42,3
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- I Sverige utförs behandling för osseointegrerad protes vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes UniveristetsSjukhus och Karolinska sjukhuset

Namn	Antal	%
Sant	9	34,6
Falskt	17	65,4
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- ISPO Compass är en guide för att välja proteskomponenter.

Namn	Antal	%
Sant	9	34,6
Falskt	17	65,4
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Det är för de flesta patienter med TTA svårt att lära sig gå med en protes

Namn	Antal	%
Sant	1	3,8
Falskt	25	96,2
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- De flesta patienter som genomgår en transfemoral amputation är kandidater för protesrehabilitering

Namn	Antal	%
Sant	1	3,8
Falskt	25	96,2
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Det finns svenska nationella riktlinjer som avser vård vid benamputation (kirurgi och rehab)

Namn	Antal	%
Sant	12	46,2
Falskt	14	53,8
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Distal tryckmätning och artärduplex är del i utredning av sår på tårna som är svårläkta

Namn	Antal	%
Sant	26	100
Falskt	0	0
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Plantarabscess är ett akut tillstånd som föranleder akut ortopedisk åtgärd.

Namn	Antal	%
Sant	25	96,2
Falskt	1	3,8
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Risken för nya sår är ökad efter en amputation i framfoten varför det är viktigt att patienten får information samt remiss till ortopedteknisk enhet för formgjutna fotbäddar och vid behov skor.

Namn	Antal	%
Sant	25	96,2
Falskt	1	3,8
Total	26	100


Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Kontakt med kärlkirurg är oftast inte nödvändigt vid ett svårläkt sår efter en amputation.

Namn	Antal	%
Sant	3	11,5
Falskt	23	88,5
Total	26	100

Svarsfrekvens
100% (26/26)



- Det är lika energikrävande att gå med en lårbensprotes som en underbensprotes.

Namn	Antal	%
Sant	0	0
Falskt	26	100
Total	26	100

Svarsfrekvens
100% (26/26)

